DLP 9-7-62 236720

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DE CHAMPAGNE (Tél. 47-22-87)

7)

NT ANNUEL

(AISNE, ARDENNES, AUBE, HAUTE-MARNE, MARNE, MEUSE)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, 5, place Paul-Jamot - REIMS. C. C. P. : CHALONS-SUR-MARNE 2.802-15 . 15 I

SUPPLEMENT nº3 au BULLETIN nº33 de JUIN 1963

20 juin 1963

VIGNE

AVERTISSEMENTS

.(stadot-taia

Mildiou

Effectuer un traitement dans les vignes qui n'ont pas reçu d'applications depuis IO jours ou ont été lavées par les pluies récentes.

Vers de la grappe (Cochylis et Eudemis)

Après un vol faible et étalé, quelques pontes sont visibles dans les secteurs habituellement parasités.

En vue de limiter l'importance de la 2ème génération, il est recommandé d'appliquer un traitement, de préférence à l'aide d'un des produits curatifs suivants:

- . Parathion éthyle
- Parathion méthyle
 - Diazinon
 - Malathion

- Trichlorfon
- E.P.N.

which were the property and the introduction is not a sixty of the six

- Mévinphos (phosdrine)
- Azinphos (gusathion)
- Chlorthion: en poudrage seulement

INFORMATION

Oïdium

Ajouter un produit mouillable à la bouillie antimildiou ou exécuter un poudrage dans les vignobles au stade préfloral.

ARBRES FRUITIERS

AVERTISSEMENTS

Tavelures du pommier et du poirier

Les pluies ayant lavé les traitements précédents, renouveler la protection dès réception de l'avis.

Carpocapse des pommes et des poires

Des pontes sont signalées malgré les faibles températures.

P.17.1

- Aisne (Thiérache), Ardennes, Haute-Marne : traiter à partir du 25 juin -

Dans le reste de la Circonscription : traiter les vergers non encore protégés.

INFORMATIONS

Oïdium

Profiter des opérations d'éclaircissage pour éliminer les pousses oïdiées et renouveler la protection.

Charançons

Un charançon est signalé dans nombre de vergers situés dans des zones boisées (Forêt de Villers-Cotterêts, Forêt de Saint-Gobain). Ce coléoptère qui saute comme une altise pique les fruits, provoquant des déformations; ses attaques sont soudaines, aussi convient-il, dès l'observation des premiers adultes, d'effectuer un traitement aux insecticides organo-chlorés.

GRANDE CULTURE

AVERTISSEMENT

Mildiou de la pomme de terre

Outre les zones précédemment intéressées par des orages, la période pluvieuse qui sévit dans nos régions depuis les IO-I3 juin, nous a amené à recommander un traitement généralisé des variétés sensibles avant le 20 juin.

Malheureusement, dans la plupart des secteurs, cette protection, quand elle put être appliquée, a été totalement lessivée par les pluies. En effet, même en renforçant de 50 % les doses habituelles, un traitement n'est plus valable après 25-30 m/m de précipitations.

Bien que les conditions thermiques soient actuellement moins favorables à l'évolution de la maladie, de gros risques sont à craindre à partir du 24 juin.

Dans toute la mesure du possible, il y a intérêt à assurer une protection parfaite pour cette date. Renforcer les doses habituelles.

INFORMATION

Phytonome de la luzerne

Les larves de ce charançon se rencontrent parfois en abondance sur les secondes coupes de luzerne en cours de fauchaison.

Surveiller attentivement le départ de végétation des troisièmes coupes car il peut être sérieusement entravé par les larves.

Eventuellement, intervenir en appliquant sur le sol, de préférence par poudrage, un insecticide organique de synthèse aux doses habituelles.

Les Contrôleurs chargés des Avertissements Agricoles,

l'Inspecteur de la Circonscription phytosanitaire de REIMS,

Imprimerie de la Station de Champagne - Directeur-Gérant : L. BOUYX

